

GUIA SEROLOGIA INFECCIOSA: Síndrome Mononucleòsica

Alba Cebollero
Clara Marcó

Per qualsevol consulta contactar:
Telf. 93 8922568 (ext. 212, 217)
E-mail: acebollero@cli.cat
cmarco@cli.cat

Epstein Barr (VEB)	Paul Bunell (PB)	IgM càpsida	IgG càpsida	EBNA IgG	Anti-antigen precoç IgG
Infecció aguda/recent	+ *	+ **	+/-	-	-
Infecció recent passada	-	-/+	+	-/+	+
Infecció passada	-	-	+	+	-
Reactivació/Reinfecció	-/+	-/+	Increment	+	+

* El 50% dels nens < 5 anys poden presentar PB negatiu.

** Les IgM poden persistir positives fins passat més d'un any.

Citomegalovirus (CMV)	Càrrega viral	IgM	IgG	Avidesa IgG
Infecció aguda/recent	-/+	+ *	+/-	Baixa avidesa
Infecció passada	-	-	+	Alta avidesa
Reactivació/Reinfecció	-/+	-/+	Increment	Alta avidesa

* Les IgM apareixen als 7-12 dies i poden persistir fins a 8 mesos o més

<i>Toxoplasma gondii</i>	IgM	IgG	IgA	Avidesa IgG
Infecció recent	+	+/-	+/-	Baixa avidesa
Infecció passada	-*	+	-	Alta avidesa
Reactivació/Reinfecció	+/-	Increment	+/-	Alta avidesa

*les IgM es poden persistir positives durant anys