

PERÍODES FINESTRA DE LES INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

Juny 2023

Yuliya Poliakova
Alba Cebollero

Per a qualsevol consulta contactar:

Telèfon: 93 8922568 (ext. 212)

E-mail:

zbores@cli.cat
acebollero@cli.cat

**PERÍODES FINESTRA DE LES INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
(PACIENT NO GRUP DE RISC)**

	Tests diagnòstics		Recollida de la mostra (dies postexposició)
Sífilis	Tests treponèmics	<ul style="list-style-type: none"> Es pot detectar a partir de les 2 setmanes de l'aparició del xancre sifilític (IgM) Es pot detectar a partir de les 4-5 setmanes de l'aparició del xancre sifilític (IgG) 	21 dies postexposició (si resultat negatiu repetir als 3 mesos)
	Tests no-treponèmics o reagínics	<ul style="list-style-type: none"> En el període latent entre sífilis primària i secundària, aquests tests tenen baixa sensibilitat Es pot detectar a partir de les 2-3 setmanes de l'aparició del xancre sifilític 	
Hepatitis B	HBsAg	<ul style="list-style-type: none"> HBsAg : Es pot detectar entre les 6 i 8 setmanes postexposició. En ocasions, pot arribar a ser de només 1 mes i fins a 6 mesos 	3 mesos postexposició (si resultat negatiu i pacient no immunitzat, repetir al 6 mesos)
	anti-HBc (IgM e IgG)		
Hepatitis C	Anti-VHC	<ul style="list-style-type: none"> Es pot detectar a partir de les 6-7 setmanes postexposició 	3 mesos postexposició (si resultat negatiu repetir al 6 mesos)
	Càrrega viral	<ul style="list-style-type: none"> Es pot detectar a partir de la 1-2 setmanes postexposició 	No sol·licitar com cribratge (excepte si presenta alteració aguda dels enzims hepàtics)
Hepatitis A	anti-VHA (IgM)	<ul style="list-style-type: none"> Es pot detectar 5-10 dies abans de l'aparició dels símptomes 	Només en cas de clínica compatible
Infecció pel VIH	Anticòsos VIH-1/2 + Antígen p24 (Test comb)	<ul style="list-style-type: none"> Es pot detectar a partir de 3 setmanes postexposició 	21 dies postexposició (si resultat negatiu repetir al 3 mesos)
	Càrrega viral	<ul style="list-style-type: none"> Es sol positivar a partir de 2 setmanes postexposició 	No sol·licitar com a tècnica de cribratge
Herpes genital	PCR	<ul style="list-style-type: none"> Si hi ha vesícules o lesions compatibles, es pot recollir la mostra 	Només en cas de clínica compatible
Infecció genital Clamídia	PCR	<ul style="list-style-type: none"> La majoria dels casos es pot detectar a partir de 2 setmanes postexposició 	14 dies postexposició
Gonococ	PCR / Cultiu	<ul style="list-style-type: none"> Es pot detectar a partir de 7 dies postexposició 	14 dies postexposició

En pacients de grup de risc es poden recollir les mostres en qualsevol moment per totes ITS.

En cas presentar simptomatologia o en pacients amb factors de risc permanents o repetitius aquests períodes no són aplicables.

Les nostres recomanacions són:

1. En el cas de **persones amb els factors de risc**, tant simptomàtiques com asimptomàtiques, s'ha de realitzar cribratge com a mínim de *C. trachomatis*, *N. gonorrhoeae*, VIH y sífilis.
2. En el cas de persones **asimptomàtiques** després d'una exposició ocasional, s'ha de respectar el període finestra. El període finestra és el temps durant el qual la prova pot donar un resultat negatiu tot i que la persona està infectada. Tot i que algunes infeccions podem començar a detectar-les passats pocs dies després de l'exposició, per assegurar que es detecten la majoria dels casos infectats recomanem esperar 2 setmanes per realitzar el cribratge de clamídia i gonococ i 21 dies pel cribratge serològic de sífilis i VIH.
3. En el cas de persones **simptomàtiques**, s'ha de realitzar les proves **sense esperar**.
4. En HSH també es recomana realitzar la serologia de VHA, VHB i VHC. Si són seronegatiu per VHA i VHB, s'ha d'oferir vacunació.

Les mostres recomanades pel cribratge de persones asimptomàtiques

	ORAL	VAGINAL	ANAL
HSH	Insertiu: orina Receptor: frotis faringi		Insertiu: orina Receptor: frotis rectal
HSD	Insertiu: orina	Insertiu: orina	Insertiu: orina
DSH	Receptor: frotis faringi	Receptor: frotis vaginal	Receptor: frotis rectal

adaptat de la ponència de Dra. Maider Arando

Les mostres recomanades pel cribratge de persones simptomàtiques

Síntomes de **cervicitis/vaginitis**: frotis vaginal

Síntomes de **uretritis**: frotis uretral o orina

Síntomes de **proctitis**: frotis rectal

Úlceres genitals: frotis d'exsudat de la úlceres (per VHS, LGV i sífilis)

Síntomes generals que facin sospitar VIH i/o sífilis: sèrum i plasma EDTA

A més, en tots els casos simptomàtics amb sospita d'ITS, independentment de la simptomatologia, cal demanar serologia de VIH i sífilis