

NOTA INFORMATIVA

DATA : 25/06/2024

DISTRIBUIR:

Serveis d'Endocrinologia i Centres d'Atenció Primària.

ASSUMPTE:

Canvi de valors de referència de l'Hemoglobina glicosilada.

Seguint les recomanacions de l'Associació Americana de Diabetes s'actualitzen els valors de referència de l'Hemoglobina Glicosilada:

Valors actuals:

4.0 – 6.1 % (<43 mmol/mol)

Valors nous:

- No diabetis: ≤ 5.6 % (≤ 38 mmol/mol)
- Prediabetis: 5.7 – 6.4% (39–47 mmol/mol)
- Diabetis: ≥ 6.5 % (≥ 48 mmol/mol)
- Seguiment: objectiu en pacients diabètics (excepte embarassades): <7% (<53 mmol/mol).

Bibliografia:

American Diabetes Association Professional Practice Committee;

2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care 1 January 2024; 47 (Supplement_1): S20–S42. <https://doi.org/10.2337/dc24-S002>.

6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes—2024 Diabetes Care 1 January 2024; 47 (Supplement_1):S111–S125 | <https://doi.org/10.2337/dc24-S006>.

SIGNAT:

Marina Carbonell

Facultatiu especialista en Anàlisi Clíniques (Àrea Hormones)

T: 93.892.35.08 Ext. 202

CLILAB Diagnòstics